Clinique Sainte Clotilde et Clinique Saint Vincent

OCCLUSION CAROTIDIENNE AIGUE ET AVC : QUE FAIRE ?

Dr Gilles Lerussi

Clinique Sainte Clotilde

29/10/16

G R O U P
E - D E -
S A N T E
C L I N I
F U T U R

OCCLUSION CAROTIDIENNE AIGUE

- Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) une des principales causes de décès en France.
- 3^{ème} cause de mortalité dans les pays industrialisés.
- Sur 100 accidents:
 - 20 sont d'origine hémorragique (intra crânienne ou sub-arachnoïdienne),
 - 80 sont d'origine ischémique

URGENCE VITALE

- Admission initiale des patients en salle d'IRM
 - **Evaluation neurologique**
NIHSS + SUNV
 - **IRM**
parenchyme cérébral
vaisseaux intracrâniens

¹ Summers D et al. Stroke. 2009;40(8):2911-44

IRM

- **2 Séquences de Diffusion (B1000+ADC)**
 - B1000 ► **Ischémie** Hypo signal ultra précoce

IRM

- **2 Séquences de Diffusion** (B1000+ADC)
 - ADC ► **Ischémie** Hypo signal moins lisible

IRM

- **FLAIR: ischémie de plus de 4 Heures**

IRM

- T2*: hémorragie

IRM

- **TOF**: imagerie vasculaire sans contraste

IRM

○ Perfusion

- Produit de contraste

Parenchyme sain

Zone d'ischémie réversible:

Allongement du TTP

Augmentation du MTT et du VSC

IRM: PAS DE MISMATCH

Necrosis

Ischemia

Mismatch

IRM: MISMATCH

ADC = dif
MTT = pe

Necrosis

Ischemia

Mismatch

QUELLE PRISE EN CHARGE ET QUAND?

- Thrombolyse IV
- Endovasculaire
- Thrombectomie
- Chirurgie

THROMBOLYSE IV

THROMBOLYSE IV

- rt-PA indiqué avec délai de 4H30
- Patients de moins de 80 ans
- Score NIHSS compris entre 4 et 25.
- Exclure les accidents ischémiques de plus d'un tiers du territoire de l'artère cérébrale moyenne

RISQUE HEMORRAGIQUE

ENDOVASCULAIRE

ENDOVASCULAIRE: THROMBOLYSE INTRA ARTÉRIELLE

- Administration fibrinolytique in situ
- Deux études randomisées : PROACT I et II
- Delai 6H
- Avantage:
 - Meilleur résultat clinique
- Inconvénients:
 - Plus d'hémorragies
 - Delai de mise en œuvre

ENDOVASCULAIRE: THROMBECTOMIE INTRA ARTÉRIELLE

- Depuis 2004
- Dispositif MERCI (Mechanical Embolus Removal in Cerebral Ischemia) plus étudié
- Dispositif PENUMBRA

MERCI® RETRIEVAL SYSTEM

THE PENUMBRA SYSTEM

ENDOVASCULAIRE: THROMBECTOMIE INTRA ARTÉRIELLE

- Taux de recanalisation élevé
- Impact clinique restait:
 - Evolution favorable à 90 jours chez 36% et 25%
- Taux d'hémorragie intracrânienne symptomatique 7.8% à 11.2%

APPROCHE COMBINÉE

- ETUDE RECANALISE (2009, LANCET):
- Meilleur taux de recanalisation (87% vs 52%)
- Associée à évolution clinique
- Pas de surmortalité ou d'hémorragie

STENTS

- Amélioration de la durée de la procédure
- Amélioration du taux de recanalisation
- Stenting primaire dans certains centres
- Mais nécessite une bithérapie antiagrégante plaquettaire:
 - risque élevé hémorragique
 - Risque de thrombose intra-stent

STENTS RETRIEVERS

- stent « récupérable » ou stent-retriever
- Recanalisation rapide par déploiement du stent temporaire
- Extraction en récupérant le stent (3 à 10 min)

Solitaire™ FR
Trevo® pro 4
Revive™ SE
Aperio®
Capture™
pREset®

PLACE DE LA CHIRURGIE

CAS 1

Homme 43 ans

PATIENT 43 ANS
TABAC ACTIF

Intervention
Pompiers
12H30

LIEU DE L'INTERVENTION		PLAINTES EXPRIMÉES
☒ Domicile ☐ Travail ☐ Médical ☐ Voie publique ☐ Lieu public ☐ Transport ☐ Judiciaire ☐ Loisirs ☐ Sport ☐ Scolaire		<p><i>Ne sent pas beaucoup son bras et sa jambe</i></p>
Adresse :		
Examen clinique et évolution		
Ext : (Int / Méd.:		Signature :
CCMU : ETAT STABLE ☐ SUSCEPTIBLE DE S'AGGRAVER ☐ PRONOSTIC ENGAGE SANS REA ☐ REA ☐		
Heure :		
<p><i>→ <u>Aléni</u> avec marque du mot</i></p> <p><i>→ B&C sytémé w... assés</i></p> <p><i>→ Courant / orate</i></p> <p><i>→ <u>Phyzi 1150 / Parcni 1110</u></i></p>		

Aux urgences
Examen 16H30

A L'ARRIVEE

- Patient demi assis dans le brancard
- TA 12/6
- Plégique à droite, mb sup & mb inf
- Aphasie par manque du mot
- Reprise de l'interrogatoire
 - Début brutal des symptômes la veille au soir
 - Hemi-Parésie fluctuante
 - Aggravation cette après midi
 - Patient droitier

IMAGERIE

PRISE EN CHARGE AUX SOINS INTENSIFS

- **Contrôle de la tension**
- Mise à plat strict voire Tredelenburg
- Objectif tension TAS 160-220 mmHg
 - Réduction prudente de la TA si HTA >220/120 à plusieurs reprises
- Arrêt de tous les anti hypertenseurs sauf BB

EVOLUTION

Après 10 minutes

commence à relever la jambe

Parle mieux

Après 45 minutes

Parle quasi normalement

Tient la jambe surélevée + de 5 sec

A une ébauche d'abduction du bras

PRISE EN CHARGE AUX SOINS INTENSIFS

○ Les anti thrombotiques

- Aspirine 300 mg/IV (*si hémorragie non*)
 - Puis 160 mg/jour
- Héparine IVSE (*fonction taille AVC*)
 - Objectif TCA 1,7-2,0

○ Traitements

- Tahor 40 mg per os
 - Par sonde gastrique si nécessaire
- Pas de neuroleptique
- Pas d'anxiolytique (attention prémédication)

PRISE EN CHARGE AUX SOINS INTENSIFS

○ Contrôle glycémique

- Protocole insuline si glycémies $>1,8\text{g/L}$
- Perfusion sérum physiologique
 - Pas de sérum glucose
 - Pas de ringer lactate

○ Hématose

- Masque à haute concentration O₂
- Objectif saturation 100%

ANGIO TDM

CID

CIG

**Thrombus
Flottant**

CIG

ANGIO TDM

- Artère sylvienne perméable

TDM CEREBRAL

J1

J3

TDM CEREBRAL

J1

J3

CHIRURGIE

- Endartériectomie carotidienne
 - Abord cervical
 - Tension artérielle contrôlée
 - Sténose controlatérale

CHIRURGIE

- Patch + Shunt
 - Patient toujours parétique
 - Support hémodynamique
 - Carotide rectiligne
 - Plaque limitée

CHIRURGIE

- Contrôle final angiographique
- Bon résultat
- Contrôle:
 - Vascularisation intra cérébrale
 - Restauration carotidienne

SURVEILLANCE POST-OPÉRATOIRE

○ **Contrôle tensionnel toutes 30 min**

- TAS 100-120 mmHg
 - Loxen, Eupressyl, Risordan, BB

○ **Les anti thrombotiques**

- Stop héparine IVSE, lovenox 0,4 1/j
- Aspirine 160 mg/j IV

○ **Autres**

- Soins intensifs, glycémie, température
- Examen neuro simple toutes les 2 heures
- Reprise alimentation si pas de fausse route

○ **Reverticalisation très progressive**

- J2-j3:45 degrés, J4-J5: pied en bas, J6-J7: fauteuil etc...

INDICATIONS

○ Indication chirurgicale

sténoses carotidiennes après thrombolyse > 50%
selon NASCET¹

○ Critères d'opérabilité

- État neurologique stable
- Recanalisation des vaisseaux intracrâniens
- AVC < 1/3 du territoire sylvien
- Absence d'œdème ou d'hémorragie cérébrale

¹ Committee NASCET. Stroke. 1991;22(6):711-20.

- TDM cérébral systématique 24h avant chirurgie

Transformation hémorragique (TH) asymptomatique?

- **Si présente:**
 - chirurgie repoussée
 - modification prise en charge médicale
 - TDM cérébraux répétés jusqu'à disparition
signes hémorragiques

OCCLUSION CAROTIDIENNE AIGUE ET AVC

- Prise en charge spécifique
- Délai +++
- Stroke center (accès IRM)
- Thrombolyse IV
- Nouvelles perspectives: thrombectomie carotidienne intracérébrale
- Chirurgie des sténoses carotidiennes internes >50%

DEATH BY POWERPOINT

MERCI POUR VOTRE ATTENTION