

ACTVOI
ASSOCIATION DE CHIRURGIE THORACIQUE
ET VASCULAIRE OCEAN INDIEN

8^e CONGRES
DE L'ACTVOI
29-31
OCTOBRE
2016

HOTEL HILTON
FLIC EN FLAC,
ILE MAURICE

ACCUEIL
DES PARTICIPANTS
SAMEDI
29 OCTOBRE 2016
A 14H30

PRESIDENT: Dr. Reuben Veerapen
SECRETAIRE: Dr. Gilles Lerussi

**Pour les recommandations pour le traitement
de la MTEV**

Pr MA Sevestre CHU Amiens

- Liens d'intérêt
- Leo Pharma, Bayer SA, Pfizer BMS, Aspen et Daichii

Pourquoi se poser la question de savoir si des données scientifiques validées par le plus grand nombre, établies à partir de données méthodologiques solides et d'essais thérapeutiques sont supérieures à la décision d'un médecin seul dans son cabinet face au patient ?



CONFLIT AVEC L INDUSTRIE

Pour les
de grand
nombre, établies à partir de données
méthodologiques solides et d'essais
thérapeutiques sont supérieures à la décision
d'un médecin seul dans son cabinet face au
patient ?

CONFLIT AVEC L INDUSTRIE

ON NOUS CACHE TOUT...le
complot

Pour les
de grand
nombre, et
méthodolo
thérapeu
d'un mé
patient ?

essais
à la décision
net face au

Po
de
nombre, etab
méthodolo
thérapeu
d'un mé
patient ?

CONFLIT AVEC L INDUSTRIE

ON NOUS CACHE TOUT...le
complot

La médecine naturelle
et les forces cachées

es
and

Où sont donc les neiges d'antan?

Le siècle des Lumières a vécu et la médecine basée sur des preuves aussi ?



Soyons raisonnables et prenons un exemple :

Antithrombotic Therapy for VTE Disease

CHEST Guideline and Expert Panel Report

Clive Kearon, MD, PhD; Elie A. Akl, MD, MPH, PhD; Joseph Ornelas, PhD; Allen Blaivas, DO, FCCP; David Jimenez, MD, PhD, FCCP; Henri Bounameaux, MD; Menno Huisman, MD, PhD; Christopher S. King, MD, FCCP; Timothy A. Morris, MD, FCCP; Namita Sood, MD, FCCP; Scott M. Stevens, MD; Janine R. E. Vintch, MD, FCCP; Philip Wells, MD; Scott C. Woller, MD; and COL Lisa Moores, MD, FCCP


9. In patients with a first VTE that is an unprovoked proximal DVT of the leg or PE and who have a (i) low or moderate bleeding risk (see text), we suggest extended anticoagulant therapy (no scheduled stop date) over 3 months of therapy (Grade 2B), and (ii) high bleeding risk (see text), we recommend 3 months of anticoagulant therapy over extended therapy (no scheduled stop date) (Grade 1B).

Comment en arrive t on là ?

Six Months vs Extended Oral Anticoagulation After a First Episode of Pulmonary Embolism


The PADIS-PE Randomized Clinical Trial : (24 mois vs 6 mois)

Francis Couturaud, MD, PhD; Olivier Sanchez, MD, PhD; Gilles Pernod, MD, PhD; Patrick Mismetti, MD, PhD; Patrick Jego, MD, PhD; Elisabeth Duhamel, MD; Karine Provost, MD; Claire Bal dit Sollier, MB; Emilie Presles, MS; Philippe Castellant, MD; Florence Parent, MD; Pierre-Yves Salaun, MD, PhD; Luc Bressollette, MD, PhD; Michel Nonent, MD, PhD; Philippe Lorillon, PharmD; Philippe Girard, MD; Karine Lacut, MD, PhD; Marie Guégan, MS; Jean-Luc Bosson, MD, PhD; Silvy Laporte, MS, PhD; Christophe Leroyer, MD, PhD; Hervé Décousus, MD; Guy Meyer, MD; Dominique Mottier, MD; for the PADIS-PE Investigators



MTEV non provoquée : anticoagulation au long cours ??

Cumulative Risk of the Recurrent VTE over the Entire Study Period



À M42 :
PCB 22,1%
AVK 17,9%

→ Le risque de récurrence persiste dans le temps

Au total

- Entre 5 et 7 ans pour
- Trouver le financement de l'étude: PHRC, Industrie...
- Faire valider le protocole
- Organiser les centres
- Recruter
- Analyser
- Publier
- Alors bien sûr....

- Possibilité de triche
- Conflits d'intérêt
- Système imparfait
- Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain
- Complexité des grades
- On ne peut modéliser la médecine aussi simplement

néanmoins

- Ce n'est pas parce que le système a des limites qu'il ne faut pas l'utiliser
- La démocratie est un système imparfait mais y a t il mieux ?

Take Home message

- **Les recommandations sont utiles pour une meilleure prise en charge des patients**
- **Elles évitent l'obscurantisme médical**
- **La médecine basée sur les preuves n'est pas opposée à la médecine personnalisée**
- **Les grades permettent de connaître le niveau de preuve**
- **Réfléchir à plusieurs permet toujours de mieux soigner**