

# Traitement par embolisation des hémorroïdes

Pr Helene Kovacsik  
CHU Montpellier





# Epidemiologie en France

- **5 % de la**  
population (3 M)
- **50 % de la**  
pathologie  
proctologique
- **90 %** traitement  
medical



# Les hémorroïdes

- tissu normal correspondant à un réseau physiologique formé de petites artérioles connectées à des espaces veineux
- Le **shunt artérioveineux** crée un “coussin” veineux responsable de la fermeture anale
- Rôle dans la continence anale
- ++
- Différencier hémorroïdes internes versus externes





## Anatomie vasculaire:

A. rectale supérieure (AMI)


A. rectale moyenne (AII)

A. rectale inf (AII-A pudendale)



# Les symptômes

- Douleurs, gêne
- Rectorragies
  - 5 à 15% des causes d'anémie
  - (Klumer MR Dis Colon Rectum 1994)
- Prolapsus




# Physiopathologie


- L'hyperpression veineuse
  - *(Berstein WC 1983 Dis Colon Rectum)*
- Concept actuel: trop haut débit artériel alimentant le shunt AV
  - *(Aigner 2006 J Gastrointest Surgery)*
- *saignements: sang rouge*



Shunt AV



# Les prises en charge actuelles: la ligature ...ARTERIELLE!



# Traitement

- Embolisation bilatérale des artères rectales supérieures distales pour occlure les shunts AV
- Agent d'embolisation: microcoils





# Results ( *publication & communications* )

- **120 patients embolized**

- **Pain :**

- VAS visual analogic scale: **-2 pt**

- **Bleeding :**

- **Bleeding score : -3 pt**

- **Quality of life (0-4)**

- Score : **- 1.5 pt**

- **Recurrence**

- **25-30 %** at one year
- Collaterals
- Proximal embolization

- [Vidal V, et al. Embolization of the hemorrhoidal arteries \(the emborrhoid technique\): a new concept and challenge for interventional radiology. \*Diagn Interv Imaging.\* 2014 Mar;95\(3\):307-15.](#)
- [Vidal V, et al. Emborrhoid: A New Concept for the Treatment of Hemorrhoids with Arterial Embolization: The First 14 Cases. \*Cardiovasc Intervent Radiol.\* 2015;38:72-8.](#)
- [Moussa N, et al. Embolization of the superior rectal arteries for chronic bleeding due to hemorrhoidal disease. \*Colorectal Dis.\* 2016 Jun 24. doi: 10.1111/codi.13430.](#)
- [Zakharchenko A, et al. Safety and efficacy of superior rectal artery embolization with particles and metallic coils for the treatment of hemorrhoids. \*Diagn Interv Imaging.\* 2016 Nov;97\(11\):1079-1084. doi: 10.1016/j.diii.2016.08.002.](#)
- [Tradi F, et al. Embolization of the Superior Rectal Arteries for Hemorrhoid disease: prospective results in 25 patients. Submitted to \*Radiology.\* Under review.](#)

# Les questions actuelles

- Faut il emboliser seulement l'artère rectale supérieure?
  - Oui dans un premier temps
  - si récurrence emboliser artère rectale moyenne
  - Variantes dans la distribution artérielle
- Quel est le meilleur embol?
  - Long terme?



Merci au Pr Vincent Vidal  
Radiologie  
CHU Marseille



Cardiovasc Intervent Radiol  
DOI 10.1007/s00270-014-1017-8

CIRSE

CLINICAL INVESTIGATION

## **Emorrhoid: A New Concept for the Treatment of Hemorrhoids with Arterial Embolization: The First 14 Cases**

**V. Vidal · M. Sapoval · Y. Sielezneff ·  
V. De Parades · F. Tradi · G. Louis ·  
J. M. Bartoli · O. Pellerin**